

## Übersicht: Tuberkulose (Aerosolisolation)

### Organisation

Meldung	▪ Spitalhygiene
Zimmer	▪ Einzelzimmer (wenn möglich mit Unterdruck)
Markierung	▪ Türschild Aerosolisolation dunkelblau
Vor dem Zimmer	▪ TB-Masken (PFR-95 oder FFP-2) ▪ Händedesinfektionsmittel + Abfalleimer

### Personal Zusätzliche Massnahmen / Standardmassnahmen

TB-Maske (PFR-95 oder FFP-2)	▪ Anziehen vor Betreten des Zimmers ▪ Ausziehen nach Verlassen des Zimmers
Händedesinfektion	▪ Gemäss den Indikationen zur Händedesinfektion
Handschuhe	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit der Hände
Schutzbrille	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit des Gesichts
Überschürze	▪ Bei Kontakt mit Körpersekret/-flüssigkeit des Körpers/Arme

### Patient ausserhalb Patientenzimmer/Untersuchungen

Aufenthalt ausserhalb Patientenzimmer	▪ In Spitalräumlichkeiten nicht erlaubt
Untersuchung	▪ Information Zielabteilung/Untersucher/Transportdienst
Transport	▪ Patient trägt eine chirurg. Maske
Untersuchungsbereiche	▪ Details siehe Richtlinie „Tuberkulose“

### Besucher

Besucher	▪ TB-Maske (PFR-95 oder FFP-2) Instruktion durch Pflege über korrektes Anziehen/Tragen
----------	---

### Reinigung / Desinfektion / Entsorgung

Flächen /Geräte	▪ Gezielte Flächendesinfektion
Instrumente	▪ Reguläre Aufbereitungsabläufe
Abfall/Wäsche/Geschirr	▪ Übliche Arbeitsabläufe
Tgl. Zimmerreinigung	▪ Übliche Arbeitsabläufe

### Aufhebung Isolation

Entisolation	▪ Durch pneumologischen/infektiologischen Facharzt
Zimmerreinigung	▪ Keine Schlussdesinfektion, reguläre Arbeitsabläufe, bis 1 h nach Entlassung des Pat. TB-Maske notwendig
Meldung	▪ Spitalhygiene